



Das Rebhuhn

Perdix perdix

28.04.2026

Martin Rümmler | NABU Bundesverband



© NABU/Mathias Schäf

Erscheinung

Aussehen & Verhalten

- Verwandtschaft: Hühnervögel → Fasanenartige



Erscheinung

Aussehen & Verhalten

- Verwandtschaft: Hühnervögel → Fasanenartige
- acht Unterarten weltweit
- Geschlechtsunterschiede minimal
- Standvogel



© NABU/Jan Piecha



© NABU/Mathias Schäf



© NABU/Mathias Schäf

Verbreitung

Und Bestand


- Europa und Asien
- Nordamerika eingeführt → 800.000 (2021)
- 70 % Weltpopulation in Europa → 2,3-3,7 Mio. (2021)
- Global abnehmend, aber als ungefährdet
- In Deutschland stark gefährdet → Abnahme 87 %
- 35.000 -61.000 Reviere (2017-2022)



Lebensraum

Und Ansprüche

- Steppen Zentralasiens
- Offenland → Kulturfolger
- Nahrung & Schutz
- Vielseitige Feldkulturen
- Strukturierte Feldraine



Fortpflanzung

- Revierruf des Männchens (Dämmerung) „girrhäk“
- Monogame Dauerehe
- Brutbeginn April bis Anfang Mai
- Nestbau Weibchen (10-20 Eier)
- Brutdauer 25 Tage (synchrones Schlüpfen)
- Verlassen mit Eltern Nest
- Flugfähig mit 14 Tagen (selbständig mit 5 Wochen)
- Bleiben im Winter im Familienverband
- Geschlechtsreife im ersten Jahr



Gefährdung

Ursachen des Rückgangs

- Verlust von:
 - Lebensraum
 - Nahrung
 - Schutz
- Jagd





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

28.04.2026

Martin Rümmler | NABU Bundesverband

